MYQORZO™ (aficamten) 5·10·15·20 mg tablets

REMS DE MYQORZO™

Guía para el paciente

¿Qué es MYQORZO (aficamten)?

MYQORZO es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva (CMHO) sintomática.

¿Cuál es el riesgo más grave del tratamiento con MYQORZO?

En algunos pacientes, MYQORZO puede causar insuficiencia cardíaca, que se produce cuando el corazón no puede bombear con la fuerza suficiente.

- La insuficiencia cardíaca es una afección grave que puede provocar la muerte.
- Las personas pueden tener mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con MYQORZO si presentan:
  - una infección grave, o
  - un problema del ritmo cardíaco nuevo o que empeora.

¿Qué es REMS de MYQORZO?

Una **E**strategia de **E**valuación y **M**itigación de **R**iesgos (REMS) es un programa de seguridad del fármaco que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos puede exigir para determinados medicamentos con el fin de garantizar que se utilicen de manera segura. Las empresas farmacéuticas y los proveedores de atención médica deben tomar medidas adicionales para asegurarse de que los beneficios de usar el medicamento sean mayores que los riesgos. La FDA debe aprobar estos pasos como parte del programa REMS.

MYQORZO cuenta con un programa REMS debido al riesgo de insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica.

¿Qué debo saber sobre el tratamiento con MYQORZO?

Para recibir MYQORZO, debe hacerse periódicamente una prueba llamada ecocardiograma para que su proveedor de atención médica pueda evaluar cómo está respondiendo su corazón a MYQORZO. Su proveedor de atención médica solicitará esta prueba para usted.

Mientras tome MYQORZO, informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas nuevos o si estos empeoran:

- Falta de aliento
- Hinchazón en las piernas
- Fatiga
- Dolor torácico

MYQORZO™ (aficamten) 5·10·15·20 mg tablets

¿Qué necesito hacer antes de comenzar MYQORZO?

ANTES DE EMPEZAR A TOMAR MYQORZO (PRIMERA DOSIS)

1. Reciba asesoramiento de su proveedor de atención médica sobre el riesgo de insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica (cuando el corazón no puede bombear con la fuerza suficiente) con la ayuda de esta **Guía para el paciente**. Hable con su proveedor de atención médica y comprenda lo siguiente:
   - El riesgo de insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, que se produce cuando el corazón no puede bombear con suficiente fuerza.
   - Los síntomas de insuficiencia cardíaca nuevos o que empeoran.
   - La necesidad de informar a su proveedor de atención médica si presenta síntomas de insuficiencia cardíaca nuevos o que empeoran, o la necesidad de buscar otra atención médica.
   - La necesidad de hacerse ecocardiogramas antes de iniciar el tratamiento con MYQORZO y periódicamente durante el tratamiento, según lo indicado en la Información de prescripción de MYQORZO.
   - Informe a su proveedor de atención médica en especial si:
     - Presenta una infección grave.
     - Presenta un problema del ritmo cardíaco nuevo o que empeora.
2. Hágase un ecocardiograma para evaluar el corazón y ver si es elegible para el tratamiento con MYQORZO.
3. Inscríbase en el programa REMS completando el **Formulario de inscripción del paciente** con su proveedor de atención médica. La información de inscripción se proporcionará al programa REMS.

¿Qué necesito hacer mientras tomo MYQORZO?

MIENTRAS TOMA MYQORZO

4. Hable con su proveedor de atención médica y, con la ayuda de esta **Guía para el paciente**, comprenda lo siguiente:
   - El riesgo de insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, es decir, cuando el corazón no puede bombear con suficiente fuerza.
   - Los síntomas de insuficiencia cardíaca nuevos o que empeoran.
   - La necesidad de informar a su proveedor de atención médica si presenta síntomas de insuficiencia cardíaca nuevos o que empeoran, o la necesidad de buscar otra atención médica.
5. Hágase un ecocardiograma para evaluar el corazón y determinar si es elegible para continuar con el tratamiento con MYQORZO (2 a 8 semanas después de iniciar el tratamiento y cada vez que se modifique la dosis; y, a partir de entonces, cada 3 o 6 meses, según los resultados de los ecocardiogramas).

EN TODO MOMENTO

6. Informe a su proveedor de atención médica o busque otra atención médica si hay síntomas de insuficiencia cardíaca nuevos o que empeoran.

¿Dónde obtendré mi MYQORZO?

MYQORZO solo se dispensa en farmacias certificadas para participar en el programa REMS de MYQORZO.

La farmacia se pondrá en contacto con usted para surtir la receta y enviarle el medicamento a su casa.

¿Dónde puedo obtener más información sobre MYQORZO?

Puede encontrar información adicional en www.MYQORZOREMS.com o llamar a REMS de MYQORZO al 1-844-285-7367.

- Para consultar el horario del Centro de atención telefónica del programa REMS de MYQORZO, visite www.MYQORZOREMS.com.

TELÉFONO: 1-844-285-7367 FAX: 1-844-285-7399 www.MYQORZOREMS.com

MYQORZO™ y el logotipo de MYQORZO son marcas comerciales de Cytokinetics en los Estados Unidos. CYTOKINETICS® y el logotipo de CYTOKINETICS en forma de "C" son marcas comerciales registradas de Cytokinetics en los Estados Unidos y en algunos otros países.

©2026 CYTOKINETICS. Todos los derechos reservados. US-MYQ-00452 07/2026

Cytokinetics®